



1. Almeja de agua dulce Diplodon chilensis (Gray, 1828)



2. Caracol de agua dulceChilina llanquihuensis, Marshal 1933



3. Pancoras
Aegla abtao (White, 1847)



4. Camarón de rioSamastacus spinifrons (Philippi, 1882)



5. Jaiba estuarinaHemigrapsus crenulatus (H. Milen Edward, 1837)



6. CholgaAulacomya atra (Molina, 1782)

Se distribuye desde Valparaíso hasta Chiloe y también alcanzaría la región más austral de Chile y la Patagonia Argentina. Cumple un importante rol ecológico en el funcionamiento de los ecosistemas dulceacuícola como filtrador y depurador de materia en suspensión. Se distribuye solo en el Lago Llanquihue en el sur de Chile y como el resto de su género, presentan diferentes habilidades de dispersión y niveles de tolerancia a la contaminación ambiental. Se distribuye desde Angol a Chiloé, en el sur de Chile, en ríos pequeños y medianos del valle central, lago Rupanco y lago Llanquihue y desde el borde del agua y a bajas profundidades (10 m de profundidad) y asociadas con fondos pedregosos, bolones y rocas.

Habita aguas abiertas, riachuelos, ríos y lagos situados entre el borde costero y la precordillera andina, desde el río Aconcagua hasta la península de Taitao, en el sur de Chile. En los lagos, se ubica ocupando refugios bajo piedras y troncos sumergidos y a mayor profundidades excava refugios en el sedimento blando.

Se distribuye a lo largo de todas las costas y estuarios de Chile, en la zona intermareal entre 0 y 6 metros. Presenta gran capacidad de ambientación a la fluctuación de temperaturas de estos sectores.

Se distribuye Callao en Perú hasta el Estrecho de Magallanes en el sur de Chile y en el Atlántico, desde el sur de Brasil hasta Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Habita aguas poco profundas, adherida gracias a su biso, a distintos sustratos duros como piedras, rocas, arcilla dura y arena.



7. Chorito *Mytilus chilensis, Hupe 1854*




8. Choro zapato
Choromytilus chorus (Molina, 1782)




9. Almeja Venus antiqua, King y Broderip, 1832



10. Navajuela *Tagelus dombeii*, (Sowerby, 1835)



Más de 40 niños de tercero, cuarto y quinto año básico, participaron en un concurso organizado por el proyecto, donde dibujaron la especie dulceacuícola que más les gustó conocida a través del cuenta cuentos "El Caldero" que creó nuestro proyecto.



Se distribuye desde Pacasmayo (Perú) hasta el Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego, en el sur de Chile y en profundidades entre los 4 y 20 m, adheridos a sustratos duros como rocas o piedras. Puede alcanzar los 20 mm de largo, de ahí su nombre común.

Se distribuye desde el Callao (Perú) hasta Puerto Williams en el sur de Chile y vive semienterrada en fondos areno-fangosos normalmente entre el intermareal y los 25 m de profundidad. Se distribuye desde Panamá hasta el Golfo del Corcovado en el sur de Chile y los adultos se encuentran en arenas pedregosas en la zona intermareal y hasta aproximadamente los 5 m de profundidad, mientras que los juveniles habitan arenas fangosas, hasta los 6 m.

